

A-VI. Fotografías



Figura AVI-1. Las fotografías superior e inferior muestran los humedales del punto P1.1 y P1.3 respectivamente, en la localidad TER 1 (Bonmatí).



Hembra de tritón palmeado (*Lissotriton helveticus*) y piscardio (*Phoxinus phoxinus*).



Larvas de sapo partero (*Alytes obstetricans*).



Rana común adulta (*Pelophylax perezi*).



Sapillo pintojo (*Discoglossus pictus*).



Gripau comú adult (*Bufo spinosus*).



Tòtil trobat mort (*Alytes obstetricans*).



Larvas de salamandra (*Salamandra salamandra*) y tricóptero.



Huevo de tritón palmeado (*Lissotriton helveticus*).

Figura AVI-2. Anfibios y otra fauna acuática de la localidad TER 1.



Figura AVI-3. Las fotografías superior e inferior muestran los hábitats acuáticos de los puntos P2.2 i P2.4 respectivamente, de la localidad TER 2 (Bescanó).



Larvas de salamandra (*Salamandra salamandra*) y sapo común (*Bufo spinosus*).



Larva de tritón palmeado (*Lissotriton helveticus*).



Adulto de sapo partero (*Alytes obstetricans*).



Adulto de rana común (*Pelophylax perezi*).



Larva de sapo partero (*Alytes obstetricans*).



Salamandra (*Salamandra salamandra*) adulta.



Adulto de sapo común (*Bufo spinosus*)



Adulto de sapo corredor (*Epidalea calamita*)

Figura AVI-4. Anfibios detectados en los puntos y transectos de la localidad TER 2 (Bescanó).



Figura AVI-5. Hábitats acuáticos de la localidad LLÈMENA 1 (Sant Gregori).



Larvas de sapo común (*Bufo spinosus*).



Larvas de sapillo pintojo (*Discoglossus pictus*).



Hembra de tritón palmeado (*Lissotriton helveticus*).



Sapillo pintojo (*Discoglossus pictus*).



Sapo corredor (*Epidalea calamita*) observado en el transecto T3.1.



Larva de sapo partero (*Alytes obstetricans*) en estado avanzado de desarrollo.



Sapo de espuelas (*Pelobates cultripipes*) observado en el transecto T3.1.



Traslación de *Pelodytes punctatus* y *Pelobates cultripipes* provenientes de un rescate de fauna en el Clot d'Espolla (Pla de l'Estany).

Figura AVI-6. Anfibios detectados en los puntos y transectos de la localidad LLÉMENA 1.



Figura AVI-7. Hábitats acuáticos de la localidad TER 3 (Sobrànigues).



Sapillo pintojo (*Discoglossus pictus*).



Espinoso (*Gasterosteus aculeatus*).



Cangrejo rojo americano (*Procambarus clarkii*).



Larva de sapillo pintojo (*Discoglossus pictus*).



Juvenil de galápago europeo (*Emys orbicularis*)
pocedente del programa de reintroducción.

Figura AVI-8. Anfibios y otra fauna detectada en los puntos y transectos de la
localidad TER 3 (Sobrànigues).



Figura AVI-9. Hábitats correspondientes a los puntos P5.2 (arriba) y P5.3 (abajo), los dos puntos de la localidad TER 4 (Sobrànigues).



Dos hembras de tritón palmeado (*Lissotriton helveticus*) y cangrejo rojo americano (*Procambarus clarkii*).



Larva de ranita meridional (*Hyla meridionalis*).



Juvenil de sapillo pintado (*Discoglossus pictus*) de morfotipo rallado.



Araña acuática (*Dolomedes* sp.) y larvas de sapillo pintado (*Discoglossus pictus*).



Rasbora (*Pseudorasbora parva*).



Larva de tritón palmeado (*Lissotriton helveticus*).

Figura AVI-10. Anfibios y otra fauna detectada en la localidad TER 4 (Sant Llorenç de les Arenes).



Figura AVI-11. Abajo, P6.1. Arriba, charca efímera correspondiente al P6.3, los dos puntos de la localidad TER 5 (Sant Llorenç de les Arenes, Foixà).



Adulto de ranita meridional (*Hyla meridionalis*).



Sapo corredor (*Epidalea calamita*).



Pareja de tritones palmeados (*Lissotriton helveticus*).



Juvenil de sapillo pintojo (*Discoglossus pictus*).

Figura AVI-12. Anfibios observados en la localidad TER 5 (Sant Llorenç de les Arenes, Foixà).